

AVERTISSEMENTS



POUR BONNES PRATIQUES AGRICOLES

BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°8 du 25 Sept. 2000 - 5 pages

Désherbage

Pour améliorer l'efficacité du désherbage et préserver la qualité de l'eau, un suivi des mauvaises herbes est mis en place en Bretagne.

Il a pour but de pouvoir préconiser à titre expérimental en 2000 des interventions ciblées sur les adventices selon leur stade de développement avec des herbicides au meilleur profil environnemental.

Cette opération réalisée en commun entre :

- -laDRAF-SRPV
- et la FE.RE.DEC de Bretagne

bénéficie du soutien du Conseil Régional de Bretagne. BRETAGNE

Les informations seront reprises dans le bulletin d'avertissement agricole et disponibles sur le site Internet : http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr

Avant la récolte: faire le bilan sur la flore restante

Il est l'heure désormais de faire le bilan sur les efficacités et surtout de faire le point sur les adventices restantes à la récolte. Elles présentent un potentiel de graines important ; ces graines se retrouveront dans les cultures suivantes. Cette observation permet aussi de juger l'efficacité de votre programme herbicide.

Unréseau d'observation

Cette observation est effectuée sur un réseau de parcelles par le SRPV et la FEREDEC. Les résultats seront présentés dans le bulletin suivant. Les agriculteurs et les techniciens peuvent également réaliser cette observation à l'aide des fiches ci-jointes.

Fichestype

L'observation de la flore est basée sur un parcours dans la parcelle. On détermine quatre placettes de notation. Chaque placette fait l'objet d'une notation sur 10 m d'entre-rang (voir fiche 1).

La seconde fiche permet d'inscrire les différents renseignements concernant la parcelle

Sur la troisième, on inscrit dans les colonnes 1 à 4, les notes de chacune des quatre placettes observées en tenant compte des grilles.

La quatrième fiche explique les grilles de notation.

Pour la reconnaissance des mauvaises herbes, consulter la rubrique Liste des mauvaises herbes du site Internet.

Interpréter les résultats.

Après avoir observé les quatre placettes dans la parcelle, il est nécessaire de calculer la moyenne arithmétique pour chaque adventice (colonne M).

Les conséquences pour la culture suivante et le choix du désherbant mais (dans la rotation) seront présentés dans le prochain bulletin avec la synthèse de notre réseau.



Prochain Mi-Octobre 2000

DRAF Bretagne Service Régional de la Protection des Végétaux 35701 RENNES CEDEX 7 sournis

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rennes Directeur gérant : P.BLANCHET Publication périodique C.P.P.A.P n°528 AD ISSN n°1167-2382



A la récolte faire le bilan

P64